

CS498 Tixocortol-21-pivalate

CAS#: 55560-96-8

Wat is tixocortol-21-pivalate?

Tixocortol-21-pivalaat behoort tot de groep geneesmiddelen die bijnierschors hormonen of corticosteroiden worden genoemd. Tixocortol-21-pivalaat is een ontstekingsremmend topisch corticosteroïde gebruikt bij de behandeling van rhinitis (als een nasale suspensie of aerosolen), faryngitis (als zuigtabletten), colitis ulcerosa (als klysma) en orale ontstekingsaandoeningen (zoals een suspensie of een poeder).

Het is ook de belangrijkste substantie voor het screenen van contact-allergieën op groep A-steroiden. Bij plakproeven met corticosteroiden treden niet zelden late reacties op. Bij sterke verdenking op een allergie voor corticosteroiden zult u dan ook gevraagd worden om de plakproeven ook na 7 dagen te laten aflezen.

Hoe kunt u het contact met deze stof vermijden?

Vermijd producten waarvan de ingrediëntenlijst bestaat uit één of meerdere van de volgende namen:

- Tixocortol 21-pivalate
- Tixocortol pivalate
- 11beta,17-Dihydroxy-21-mercaptopregn-4-ene-3,20-dione 21-pivalate
- EINECS 259-706-4
- JO 1016
- Pivalone
- Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-((2,2-dimethyl-1-oxopropyl)thio)-11,17-dihydroxy-, (11beta)-
- S-(11beta,17-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione) 21-(thiopivalate)

Stoffen verwant aan tixocortol-21-pivalate?

Bij patiënten die positief reageren op tixocortol-21-pivalate komen kruisreacties voor met de andere corticosteroiden uit groep A (cortison acetaat, fludrocortison, hydrocortisonacetaat, methylprednisolon, prednisolon, prednison) en met hydrocortisonbutyraat.

Relatief 'veilige' middelen zijn de meesten van de groep C corticosteroiden, zoals desoximetason, dexamethason, fluocortolon en van groep E, mometasonfuoraat. De kans op een allergische reactie is voor deze middelen gering, eveneens is de kans op een kruisreactie gering indien er eerder een allergie op tixocortolpivalaat en budesonide werd aangetoond.

In welke producten kan deze stof voorkomen?*

Tixocortol-21-pivalate wordt gebruikt in medicamenten voor de behandeling van eczeem, psoriasis, astma, langdurig ontstoken neusslijmvlies, hooikoorts, neuspoliepen, longemfyseem en bronchitis. In de vorm van crèmes, druppels, neussprays, lotions, poeders, rectale suspensies of zalven

Opmerking - Patiënten kunnen ook reageren op producten die de volgende stof bevatten*:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| • Amcinonide | • Hydrocortisone butyraat |
| • Budesonide | • Hydrocortisone-probutaat |
| • Cloprednol | • Hydrocortisone buteptraat) |
| • Desonide | • Hydrocortisone valeraat |
| • Fludrocortisoneacetaat | • Methylprednisolon |
| • Fluocinoloneacetonide | • Micronized fluocinonide |
| • Fluocinonide | • Prednicarbate |
| • Flurandrenolide | • Prednisolon |
| • Halcinonide | • Prednisolone acetaat |
| • Hydrocortisone | • Steroid: group b |
| • Hydrocortisone 17-butyraat | • Steroid: group d2 |
| • Hydrocortisone acetaat | • Triamcinolone |

*De lijst van genoemde producten is slechts een leidraad en mogelijk niet compleet aangezien deze steeds kunnen wisselen.