

CS497 Budesonide

CAS#: 51333-22-3

Wat is Budesonide?

Budesonide behoort tot de groep geneesmiddelen die bijnierschors hormonen of corticosteroiden worden genoemd. Budesonide is een groep B-glucocorticoïde-steroïde voor de behandeling van astma, hooikoorts en andere allergieën, en voor de behandeling en preventie van neuspoliepen. In de neus verstoven budesonide werkt ontstekingsremmend en voorkomt zwelling van het neusslijmvlies. Bovendien wordt het gebruikt voor inflammatoire darmaandoeningen.

Bij plakproeven met corticosteroiden treden niet zelden late reacties op. Bij sterke verdenking op een allergie voor corticosteroiden zult u dan ook gevraagd worden om de plakproeven ook na 7 dagen te laten aflezen.

Hoe kunt u het contact met deze stof vermijden?

Vermijd producten waarvan de ingrediëntenlijst bestaat uit één of meerdere van de volgende namen:

- Budesonide
- CCRIS 5230
- EINECS 257-139-7
- S 1320
- (11-beta,16-alpha)-16,17- (Butylidenebis(oxy))-11,21- dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
- (RS)-11beta,16alpha,17,21- Tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20- dione cyclic
- 16,17-acetal with butyraldehyde
- 16-alpha,17-alpha-Butylidenedioxy-11- beta,21-dihydroxy-1,4-pregnadiene- 3,20-dione
Pregna-1,4-diene-3,20-dione,
- 16,17-(butylidenebis(oxy))-11,21-dihydroxy-, (11-beta,16-alpha)-Pregna-1,4-diene-3,20-dione,
- 16,17- butylidenebis(oxy)-11,21-dihydroxy-, (11beta,16alpha(R))-,
- 16alpha,17-((S)-Butylidenebis(oxy))-11beta,21- dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
Pregna-1,4-diene-3,20-dione,
- 16,17-(butylidenebis(oxy))-11,21-dihydroxy-, (11beta,16alpha)-

Stoffen verwant aan budesonide?

Patiënten die positief reageren op budesonide kunnen ook reageren op de groep B corticosteroiden, de 'acetonide'-groep (w.o. amcinonide, triamcinolonacetonide, fluocinolonacetonide, fluocinonide, halcinonide). Ook zijn er kruisreacties mogelijk met enkele uit de groep D corticosteroiden, zoals aclo-methasondipropionaat, hydrocortisonbutyraat en betamethasonvaleraat. Relatief 'veilige' middelen zijn de meesten van de groep C corticosteroiden, zoals desoximetason, dexamethason, flucortolon en van groep E, mometasonfuoraat. De kans op een allergische reactie is voor deze middelen gering, eveneens is de kans op een kruisreactie gering indien er eerder een allergie op tixocortolpivalaat en budesonide werd aangetoond.

In welke producten kan deze stof voorkomen?*

Budesonide wordt gebruikt in medicamenten voor de behandeling van o.a. astma, langdurig ontstoken neusslijmvlies, allergie, hooikoorts, neuspoliepen, longemfyseem en bronchitis.

*De lijst van genoemde producten is slechts een leidraad en mogelijk niet compleet aangezien deze steeds kunnen wisselen.